

蟲害核准登記使用藥劑一覽表

文/林秀榮 整理

安全採收期	農藥名稱	稀釋倍數	葉蟻類	蚜蟲類	薊馬	夜蛾類	毒蛾類	粉蝨類	斑潛蠅類	切根蟲	施藥時期及方法
0 天	99%礦物油乳劑	500	●	●							1.害蟲發生時開始施藥，必要時隔 10 天再施藥一次。 2.建議傍晚使用，避免造成日燒藥害。
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	4,000				●					害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天再施藥一次。
6 天	1%密滅汀乳劑	1,000	●								
		1,500		●							
	50%培丹水溶性粉劑	1,000		●							
9 天	0.5%可尼丁粒劑							●			1.每公頃每次施藥 60 公斤。 2.定植後 14 天畦面施藥一次，施藥後全園灌水至畦面溼潤。
10 天	31.6%護賽寧乳劑	8,500	●								
12 天	5%芬普蟎	2,000	●								害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天再施藥一次。
	9.6%益達胺溶液	1,500			●	●					
		4,000		●							
	18.2%益達胺水懸劑	7,500		●							
		3,000				●	●				
	28.8%益達胺溶液	12,000		●							
		4,500				●	●				
	20%亞滅培水溶性粉劑	3,000				●					
		4,000						●			
		6,000		●							
25%布芬淨可溼性粉劑	1,000						●			藥液應噴到葉背。	
14 天	3%阿納寧可溼性粉劑	2,000	●								1.每公頃每次施藥 30 公斤。 2.定植前 3 天施藥 1 次，並將藥劑拌入土中 5 公分。  定植後於畦面施藥 1 次，必要時隔 10 天再施藥 1 次。  害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天再施藥一次。
	2%阿巴汀乳劑	4,000						●			
	5%陶斯松粒劑									●	
	22.5%陶斯松乳劑	700								●	
	40.8%陶斯松水基乳劑	1,000								●	
	40.8%陶斯松乳劑	1,000								●	
	22.5%陶斯松乳劑	1,500		●							
	25%陶斯松可溼性粉劑	1,500		●							

