

表 1 各種原因的茶樹枝枯症狀的比較

原因	部 位			根系	病程進展	發生時期
	枝條	葉	芽			
熱傷害 (焚風)	嫩枝條萎凋	有褐色斑塊	焦枯	正常	快速	夏季高溫
澇害 (根浸水)	直立	1. 失去光澤 2. 褐化 3. 落葉	褐化	根部軟爛	緩慢	排水不良 長期雨季
旱害 (缺水)	全株嫩枝條 軟化下垂	1. 失去光澤 2. 軟弱無力 (葉部細胞因 缺水失去膨壓 而癱軟) 3. 葉緣有塊狀 或不規則褐色 斑點 (由嫩葉開始 發生)	焦枯	根褐化	漸進	乾旱的季 節
病害 (茶枝枯病)	1. 罹病枝條萎 凋 2. 病枝條上有 病斑 3. 病斑上有黑 色柄子器	萎凋或乾枯附 著在枝條上	萎凋	正常，嚴重枝 枯病根系可能 生長不良	慢	夏季
蛀心蟲	蟲鑽的小洞內 有蟲道、蟲 體、易折斷。	同上	萎凋	正常	漸進	成蟲蛾的 發生期 在春季及 秋季
藥(肥)害	枯死	落葉、葉有褐 斑	芽枯	褐化	快	施藥(肥) 不當
蟎害	綠	落葉	芽枯	正常	漸進	蟎類危害
根部病蟲害	全株性萎凋或 死亡	黃化或落葉	芽枯	褐化	慢	根部受到 危害
人為傷害	部份枯萎	枯葉	正常	正常	快	農忙時